

# ED問診票

(以下の質問にご回答のうえ、医師等にお渡しください)

日付	年 月 日
氏名	

この6ヶ月を振り返り、当てはまる番号を選択してください。

SHIM

## I. 勃起してそれを維持する自信はどの程度ありましたか 【回答欄】

1	非常に低い	<input type="text"/>
2	低い	
3	中くらい	
4	高い	
5	非常に高い	

## II. 性的刺激によって勃起した時、どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりましたか

0	性的刺激はなかった	<input type="text"/>
1	ほとんど、又は全くならなかった	
2	たまになった (半分よりかなり低い頻度)	
3	時々なった (ほぼ半分の頻度)	
4	しばしばなった (半分よりかなり高い頻度)	
5	ほぼいつも、又はいつもなった	

## III. 性交の際、挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか

0	性交を試みなかった	<input type="text"/>
1	ほとんど、又は全く維持できなかった	
2	たまに維持できた (半分よりかなり低い頻度)	
3	時々維持できた (ほぼ半分の頻度)	
4	しばしば維持できた (半分よりかなり高い頻度)	
5	ほぼいつも、又はいつも維持できた	

## IV. 性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか

0	性交を試みなかった	<input type="text"/>
1	極めて困難だった	
2	とても困難だった	
3	困難だった	
4	やや困難だった	
5	困難でなかった	

## V. 性交を試みた時、どれくらいの頻度で性交に満足できましたか

0	性交を試みなかった	<input type="text"/>
1	ほとんど、又は全く満足できなかった	
2	たまに満足できた (半分よりかなり低い頻度)	
3	時々満足できた (ほぼ半分の頻度)	
4	しばしば満足できた (半分よりかなり高い頻度)	
5	ほぼいつも、又はいつも満足できた	

合計

<input type="text"/>
----------------------

あなたは自分の勃起硬度をどのように評価しますか？

EHS

0	陰茎は大きくなる	<input type="text"/>
1	陰茎は大きくなるが、硬くはない	
2	陰茎は硬いが、挿入に十分なほどではない	
3	陰茎は挿入には十分硬いが、完全には硬くはない	
4	陰茎は完全に硬く、硬直している	

# ED チェックリスト

1. 以前、薬によって過敏症状（発疹、発赤、かゆみ、その他のアレルギー症状）をおこしたことがありますか？ はい いいえ
2. 心臓の病気などでニトログリセリンなどの硝酸剤（舌下錠、貼り薬、塗り薬、スプレーなどを含む）を使用していますか？ はい いいえ
3. 心血管系の病気（狭心症、心筋梗塞など）がありますか？ はい いいえ
4. 肝臓の病気がありますか？ はい いいえ
5. 低血圧あるいは高血圧といわれたことがありますか？ はい いいえ
6. 脳梗塞あるいは脳出血をおこしたことがありますか？ はい いいえ
7. 網膜色素変性症と診断されたことがありますか？ はい いいえ
8. 陰茎の病気（屈曲、しこりなど）がありますか？ はい いいえ
9. 血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病など）がありますか？ はい いいえ
10. 他の勃起障害治療（薬、器具、手術など）を行ったことがありますか？ はい いいえ
11. 出血性の病気あるいは消化性潰瘍がありますか？ はい いいえ
12. 腎臓の病気がありますか？ はい いいえ
13. 他に使用中の薬がありますか？ はい いいえ
14. 他の診療科あるいは他の医療機関を受診する際には、シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」を服用していることを申し出るか、または何らかの方法で確実に医師に伝えるようにして下さい。 はい いいえ
15. シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」の服用後に4時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡して下さい。 はい いいえ
16. シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」は催淫剤（性欲増進を目的とした薬）ではありません。性的刺激を受けなければ勃起しません。ご理解いただけましたか？ はい いいえ
17. シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」の服用後は、自動車や機械の運転操作には注意して下さい。 はい いいえ
18. 食事中あるいは食直後の服用では、シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」の効果が遅れて出ることがあります。ご理解いただけましたか？ はい いいえ
19. シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」は性行為の約1時間前に服用し、1日1回までで、次の服用は24時間以上あけて下さい。 はい いいえ
20. シルデナフィル OD 錠 50mgVI「トーフ」を他の人に譲り渡さないで下さい。 はい いいえ
21. 性行為は心臓に負担をかけます。無理はしないようにしましょう。 はい いいえ

上記の項目については、私が記入しました。

年 月 日 署名 \_\_\_\_\_